



FIEBRE AFTOSA EN OVEJAS

PROGRESIÓN DE LAS LESIONES

Las lesiones de fiebre aftosa (FA) pueden ser leves o inaparentes en ovejas adultas, pero también pueden ser grave como en el ganado bovino o porcino. Se pueden observar vesículas, úlceras y erosiones en, y alrededor de la banda coronaria, la boca y la nariz. Estas lesiones causan signos clínicos como cojera. La fiebre y la reducción de la ingesta de alimento pueden ocurrir en ovejas infectadas con fiebre aftosa. Los corderos infectados a veces mueren súbitamente debido a enfermedad del corazón. La progresión (en días) de las lesiones en el siguiente cuadro son aproximadas.

	BANDA CORONARIA	ALMOHADILLA DENTAL, LENGUA	MUCOSA NASAL
LESIÓN TEMPRANA (DÍAS 1-4)	 Palidez en la banda coronaria	 Erosión focal de la almohadilla dental y la lengua	 Erosión de la mucosa nasal
LESIÓN TARDÍA (DÍAS 5-7)	 Erosión de la banda coronaria con depósitos de fibrina	 Erosiones multifocales cicatrizando en la almohadilla dental	 Erosión en la mucosa nasal con depósitos de fibrina

Si sospecha de una enfermedad animal transfronteriza

Comuníquese con su funcionario de sanidad animal estatal (SAHO, por sus siglas en inglés) o el veterinario de área a cargo (AVIC, por sus siglas en inglés) para informar sus sospechas. Si no tiene acceso a la información de contacto del SAHO o AVIC de su área, puede llamar al 1-866-536-7593, para conocer la ubicación de la oficina de AVIC que corresponde a su estado. También puede comunicarse con el Centro Nacional de Servicios Veterinarios para Manejo de Emergencias de Sanidad Animal del USDA APHIS al 800-940-6524 (24 horas) para recibir ayuda.

Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales Transfronterizas, USDA APHIS y Servicios de Información Visual del Departamento de Seguridad Nacional, en el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island.